

# Nitrostat®

## 用藥指導

李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院  
藥劑科 關心您



藥物諮詢專線：04-26862288轉3117  
李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院

**商品名：**Nitrostat® Tablet 0.6 mg

**中文名：**耐絞寧舌下錠 0.6 毫克

**成分：**Nitroglycerin

### 為什麼服用？

- Nitrostat®具有血管擴張作用，可用於預防或緩解心絞痛（胸痛）。舌下錠作用快，主要用於心絞痛急性發作。

### 如何服用？

- 心絞痛有疼痛感、壓迫感），立刻坐下或蹲下，迅速取一片含在舌下，直到完全溶解，不可以將藥片整粒吞服。
- 含藥片時，不要咀嚼，也不可以吃東西、喝飲料、抽煙或漱口。
- 含本藥後一至五分鐘即可生效，若五分鐘後未見效果，可再含一片，五分鐘後若仍無效，再含一粒。如果含三片後胸痛仍未緩解，請迅速就醫。

### 可以和其他藥物一起服用嗎？

- 服用本藥請勿與 Viagra（威而剛）、Levitra（樂威壯）、Cialis（犀利士）併用。
- 服用藥物期間若計畫服用中藥、健康食品、或成藥及其他處方藥，尤其是降壓藥，請事先告知詢問醫師或藥師。

### 如果懷孕了，或正在哺乳，可否服用？

- 如果有計畫懷孕或確定懷孕了，請先告知醫師。美國藥物食品管理局對本藥品訂定之懷孕用藥安全級數為 C 級（無法排除對胎兒的危險性）。
- 本藥會分泌到乳汁當中，若有服用此藥的產婦，應避免哺乳給嬰兒。

### 藥物副作用？

- 暈眩、虛弱、頭痛、低血壓、噁心、嘔吐，若有昏倒的現象請立即就醫。

### 要如何保存？

- 應儲存在陰涼、乾燥，且兒童不易取得之處。
- 舌下錠不使用時或使用後應保存在原裝的棕色瓶子內並且旋緊，不要與其他藥物併放。

### 服用注意事項？

- 勿將此藥品分送給他人使用。
- 可能會引起頭暈，從事需高度警覺工作時，應特別小心。
- 任何時間都要隨身攜帶藥品，以防止突然心絞痛發作。
- 有藥物過敏史的病人應主動告知醫師及藥師。
- 不宜飲酒及抽煙；勿將藥品分贈他人使用。