

Dilantin®

用藥指導

李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院
藥劑科 關心您



藥物諮詢專線：04-26862288轉3117
李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院

商品名：Aleviatin 100mg
中文名：阿雷比阿慶錠 100 毫克
成分：Phenytoin sodium

為什麼要服用？

主要用來治療癲癇大發作及局部發作。

如何服用？

- 請遵照醫師指示服用。
- 如果有腸胃不適的現象，可以在飯後服用或隨餐服用。
- 請整顆吞服，勿將膠囊剝開、磨碎或咀嚼膠囊。
- 若是接受管灌進食的病人，應在進食前或後兩小時再服用藥品。

忘記服用怎麼辦？

- 想起時儘快服用。但如果已經接近下次服藥時間，則服用下一次的劑量即可。切勿同時服用兩次的劑量。

可以和其他藥物一起服用嗎？

- 使用癲能停之前，若正在服用以下藥品，請先告知醫師：Cimetidine、戒酒藥類藥品、百憂解、降血糖用藥、其它控制癲癇的藥品。
- 癲能停可能降低口服避孕藥的效果。使用前，若您正在服用口服避孕藥來做避孕

時，應先告知醫師；同時請教醫師改用其他方法避孕。

副作用是什麼？

- 本衛教單張中所提到之副作用，僅為研究報告中之部分案例，不一定會發生，請勿擅自停用藥品。
- 如果有下列副作用請立刻通知醫生：發燒、喉嚨痛、不正常出血或淤血、癲癇頻率增加、皮膚起疹或癢、起泡或脫皮、極度疲倦或頭暈、意識不清、言語不清、眼睛或皮膚變黃。
- 如果下列副作用發生一段時間後，症狀持續惡化，請儘快通知醫生：便秘、想睡、暈眩、毛髮增生、噁心、食慾減退、緊張、失眠、牙齦出血。

如何保存？

- 連同藥袋或是原包裝儲存於密閉容器內，於室溫、乾燥處避光保存；並避免置放於孩童可以取得的場所，以免誤食。

服藥注意事項？

- 切勿將藥品分給其他人服用。
- 治療前，若有下列情形，請先告知醫師：
- 曾經對癲能停有過敏反應產生。
- 有心臟、肝臟、腎臟、甲狀腺及血液方面的疾病時。
- 最近要手術或拔牙時。

- 使用藥物期間，應避免喝酒，否則會影響藥物的療效。
- 癲能停可能導致嗜睡及注意力不集中，應避免從事需有高警覺性的工作(如開車或操作具危險性的機械)。
- 治療期間，應按時回診接受檢查，並請確實遵照醫囑按量按時服藥。切勿自行增減劑量或突然停藥；癲癇患者若未經醫師同意，自己突然中斷藥物，可能會有再復發的情形。
- 用藥期間，請注意口腔衛生，應於每三個月前往牙科就診洗牙。若有牙齦紅腫、出血等情形發生時，請前往牙科就診或與您的醫師聯絡。
- 在治療期間詳細記錄您的劑量、服藥狀況、發作次數、藥物濃度以及臨床反應，以便醫師找出副作用最少、療效最大的正確劑量。
- 孩童在服用時，請家長或老師協助觀察並記錄用藥後其行為、注意力、情緒、解決問題、思考能力、睡覺型態、癲癇發作情形等。