

Plavix®

李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院
藥劑科 關心您

用藥指導



藥物諮詢專線：04-26862288轉3117
李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院

商品名：Plavix® Film-Coated Tablet 75mg
Clopidogrel ® F.C. Tablet 75mg

中文名：保栓通膜衣錠 75 毫克

可諾通"艾威群"膜衣錠 75 毫克

成分：Clopidogrel

為何服藥？

- 可降低曾發生中風、心肌梗塞或週邊動脈血管疾病的病人再度發生動脈硬化。

如何服用？

請遵照醫師指示服用，建議可空腹或飯後服用。

如果忘記服藥怎麼辦？

想起時儘快服用。但如果已經接近下次服藥時間，則服用下一次的劑量即可。切勿同時服用兩次的劑量。

可以和其他藥物一起服用嗎？

- 用藥期間，如果要使用其他藥品（包括非處方用藥、維他命、健康食品、中草藥、疫苗、預防針等），應先諮詢醫師或是藥師。
- 使用本品之前，若正在服用以下藥品，請先告知醫師：阿斯匹靈(aspirin)、抗凝血藥物(warfarin)、乳癌輔助性治療之他莫

昔芬(tamoxifen)、治療胃潰瘍藥物(如esomeprazole、lansoprazole等)、降血脂藥、精神科用藥、非類固醇類消炎止痛藥物等。

懷孕或哺乳可否服用？

- 若您計畫懷孕或可能懷孕或哺乳，請先告知您的醫師。
- 美國藥物食品管理局訂定之懷孕用藥安全級數為B級（動物顯示對胎兒無害，但是缺乏人體實驗的充分證據，或是動物實驗對胎兒有不良作用，但人體實驗對孕婦無法證明有危險性）。

副作用是什麼？

- 本衛教單張中所提到之副作用，僅為研究報告中之部分案例，不一定會發生，請勿擅自停用藥品。
- 如果有下列副作用請立刻通知醫生：胸悶、喘鳴、嚴重咳嗽、發燒、皮膚出現變化、臉部或嘴唇腫脹、不尋常的出血。
- 下列副作用可能隨身體適應藥物而消失，如果情形持續請告訴醫生：消化不良、頭痛、暈眩、心悸。

如何保存？

- 連同藥袋或是原包裝儲存於密閉容器內，於室溫、乾燥處避光保存，並避免置放於孩童可以取得的場所，以免誤食。

服藥注意事項？

- 切勿將藥品分給其他人服用。
- 治療前，若有下列情形，請先告知醫師：
 - (1) 曾經對保栓通有過敏反應產生。
 - (2) 最近要手術或拔牙。
- 使用藥物期間，應避免喝酒，否則會影響藥物療效。
- 服用保栓通時，需避免受傷及注意是否有傷口流血不止的情形。