

新型抗凝血藥物 用藥指導

李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院
藥劑科 關心您



藥物諮詢專線：04-26862288轉3117
李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院

新型抗凝血藥物

一、本院新型抗凝血藥物：

1. Dabigatran (Pradaxa、普栓達)
2. Endoxaban (Lixiana、里先安)

二、為什麼要使用這些藥？

1. 普栓達：

用於成人非瓣膜性心房顫動預防中風及全身性栓塞。

2. 艾必克凝：

用於成人非瓣膜性心房顫動預防中風及全身性栓塞，且至少有一項危險因子，

如：心衰竭、高血壓、年齡大於等於75歲、糖尿病、曾發生腦中風或短暫性腦缺血發作。

三、使用這些藥品，有那些情形該事先告知醫師？

1. 如果您曾經對此藥物或賦形劑過敏者。
2. 如果曾有消化性潰瘍病史或使用其他抗凝血劑、抗血小板藥物、消炎止痛藥者，或是有相關出血癥兆者如：牙

齦滲血、皮膚瘀青、血尿等。

3. 肝、腎功能不佳者。
4. 任何手術或拔牙前，請告知醫師或牙醫師正在接受服用本藥。。
5. 若有服用保健食品、止痛藥或其他藥品請告知醫師或藥師。
6. 孕婦或有計畫懷孕的婦女在使用此藥前一定要告知醫師。

四、使用期間該注意些什麼？

1. 普栓達：不能將其膠囊弄破、咀嚼或打開，須整粒吞服。外科手術介入或牙科處置前應先向醫療人員諮詢確認停藥天數，減低出血風險。
2. 里先安：外科手術介入或牙科處置前應先向醫療人員諮詢確認停藥天數，減低出血風險。

五、可能引起的副作用：

1. 普栓達：消化不良(包括上腹部疼痛、腹部不適等)、腸胃潰瘍、食道炎、有增加出血之機率。
2. 里先安：噁心、皮疹、搔癢、貧血、鼻

出血、腸胃道出血、皮膚軟組織出血、肝功能檢驗值異常。

五、忘記使用怎麼辦？

想起時，於同一天內立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。