

痛風治療藥物 用藥指導

李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院
藥劑科 關心您



藥物諮詢專線：04-26862288轉3117
李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院

痛風治療藥物

為什麼我要服用痛風治療藥物?

痛風一般是指體內尿酸代謝異常濃度過高而造成尿酸鹽沉積，進而在關節處產生程度不一的發炎反應與疼痛。所以當痛風發生或是血中尿酸濃度過高時，就有可能會服用痛風治療藥物，來緩解急性痛風或預防將來痛風的(再)發生。

如何服用痛風治療藥物?

- 請遵照醫師指示服用。
- 若您服用的劑量與一般指示劑量不同，請勿隨意變更劑量，除非您的醫師告知您要更改劑量。
- Colchicine®用於治療急性痛風發作，一次服用1~2顆就會緩解疼痛，若需要時，1~2小時後可再服用一顆，服藥期間如果出現腹瀉、嘔吐等胃腸障礙時則停止使用，並且儘速回診。
- Allopurinol®、Feburic®可在飯後服用，以減輕胃腸道刺激。
- 服用痛風治療藥物期間，避免大量飲酒，因為，酒精可能增加尿酸濃度並減低藥物的治療效果。

如果忘記服用怎麼辦?

想起時儘快服用。但如果已經接近下次服藥時間，則服用下一次的劑量即可，切勿同時服用兩次的劑量。

目前我懷孕了或是正在哺乳，可否服用痛風治療藥物?

- 若您計畫懷孕或可能懷孕或哺乳，請先告知您的醫師。
- 美國藥物食品管理局訂定之懷孕用藥安全級數 Colchicine®、Allopurinol®、Feburic®為C（無法排除對胎兒的危險性）。

痛風治療藥物的副作用是什麼?

- 本衛教單張中所提到之副作用，僅為研究報告中之部分案例，不一定會發生，請勿擅自停用藥品。

藥品名稱	可能出現的症狀
Allopurinol®	紅疹、皮膚發紅、搔癢、蕁麻疹、皮膚剝落、寒顫、發燒、喉嚨痛、關節痛、肌肉酸痛、噁心嘔吐、呼吸困難、皮膚或眼睛發黃。
Colchicine®	胃痛、胃或喉嚨有灼熱感、尿量突然減少、尿液或糞便顏色變深色、手或腳麻木刺痛或無

	力、紅疹、蕁麻疹、水腫、發燒、喉嚨痛、不明原因流血或挫傷。
Beenrone® Narcaricin	偶而有蕁麻疹、發疹、顏面發紅、紅斑、搔癢感、胃痛、腹痛、胃部不快感、胃灼熱、噁心、下痢、軟便等、浮腫、心窩部不快感。
Feburic® Febuxostat	肝功能異常、皮疹、噁心、關節痛

用痛風治療藥物的期間，還有什麼要注意的?

- 除非醫師有特別指示，否則每天應至少攝取8杯(約2000毫升)的水分；服藥期間避免食用過量的維生素C，以免增加體內尿酸滯留或腎結石的機會。
- 服用Allopurinol®、Feburic®期間，如皮疹發生或在皮疹發生的同時，稍後有流行性感冒樣的症狀(顫慄、發燒、肌痛或噁心嘔吐)發生時，請立即通知醫師，這些症狀可能是嚴重過敏反應的開始。
- 服用Allopurinol®期間，請定時回診追蹤治療進展，可能需要定期的血液測試，以確定治療效果及/或副作用的發生。
- 服用Colchicine®時，請斟酌葡萄柚的攝取量並定時回診由做相關的檢查。服用Beenrone®、Feburic®期間，應定期回診進行肝功能檢查。